

Védekezés a szőlő aranyszínű sárgasága ellen

1. Ütem

Mint már az előző Hírmondókban beszámoltam róla, sajnos az ebedi és az Ebed környéki települések szőlőit is megtámadta a **szőlő aranyszínű sárgaság** betegség, (röviden FD), amely egyre nagyobb fenyegetést jelent.

Néhány pontban szeretném összefoglalni, amit a kistermelőknek érdemes tudni a betegség tüneteiről, terjedéséről és a hatékony védekezési lehetőségekről.

1)A szőlő legpusztítóbb fitoplazmás betegsége

- karantén károsító, az emberre nem veszélyes, a borkészítés során a borba nem kerül bele

2) Nem gyógyítható a betegség

- ellene nem hatnak a növényvédő szerek, a fitoplazma a növény háncsszövetében él és szaporodik

3) Terjedése

- fertőzött szaporítóanyaggal

- a fertőzés terjesztőjével-átvivőjével, az amerikai szőlőkabóccával (Scaphoideus titanus)

- szőlőről szőlőre az **amerikai szőlőkabóca** közvetítésével

4) A védekezés kulcsa

- a betegség terjedésének megállítása és a megelőzés

5) Nehéz a korai felismerés

- sokszor nehezen azonosíthatóak és összetéveszthetőek más korokozók tüneteivel

- csak laboratóriumi vizsgálattal igazolható a betegség jelenléte

Az elmúlt évben az emberek nem sok figyelmet szenteltek ennek a betegségnek, sok esetben a levelek sárgulását a csapadékhiánynak rótták fel, csak a fonákjuk felé forduló levelek, a nem beérett vesszők észlelése után kezdték el kérdezgetni, hogy mi történik a szőlővel.

A szüret után megalakult egy operatív csoport, amelynek feladata elsősorban a segítségnyújtás a fertőzött tőkék feltérképezésében, mert ez most a legfontosabb teendő.

A csoport tagjai folyamatosan bejárták a falu szőlős parcelláit, és megjelölték a fertőzött tőkéket. Itt kezdődik a szőlősgazdák felelősége, ugyanis **a megjelölt egyedeket ki kell vágni tövestől, és a lehető leghamarabb elégetni.** Sajnos ez nem minden esetben történt meg. **Jó volna, ha ezt a mulasztást mielőbb pótolnák, ezáltal is csökkentve a betegség tovább terjedését.**

Számtalan cikk, rövidebb hosszabb videó jelent meg már a betegséggel kapcsolatosan, de nagyon sok téves szemlélet is napvilágra került, amelyek még jobban megzavarhatják a termelőket.

A muzslai előadáson nagyon sokszor elhangzott, hogy mennyire fontos az összehangolt védekezés.

Már Muzslán is említettem, hogy most érkezett el az első komoly megmértetés: a fertőzött tőkék likvidálása az ültetvényekből. Ez azt jelenti, hogy tövestől kell a tőkéket kivenni, és mihamarabb elégetni. Úgyszintén mihamarabb el kell távolítani az ültetvényből és elégetni a metszések levágott nyeseidéket.

Talán ez az egyetlen olyan művelet a fytoplasma elleni védekezésben, amikor nem azt kell várni, hogy majd az állami szervek megsegítenek, hanem saját magunknak kell a munkát elvégezni.

Sajnos az elhanyagolt szőlőterületekkel, amennyiben a tulajdonosaik nem gondolják meg magukat, és önszántukból nem tesznek lépéseket azok felszámolására, jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni. Már folynak egyeztetések, hogy milyen formában lehetne ezeket felszámolni, de ezek még nagyon gyerekcipőben járnak. Addig is nem marad más, csak bízni a tulajdonosok vagy a használók józan gondolkodásában.

Ez a betegség megköveteli, hogy összefogjanak a gazdák, nem csak helyi szinten, de az egész régióban, mert gyors és jól szervezett munkára lesz szükség, a szőlő aranyszínű sárgaság betegség elterjedésének megfékezésére. Nem szeretnék vészmadár lenni, de az elmúlt 2025-ös év csak az előhírnöke volt annak, ami az elkövetkező két évben vár a szőlőinkre és ránk is.

Folyt. Köv.

Ing. Révész Gábor